

Magsjuka

Symtom på magsjuka

Ett barn som har magsjuka får **ett** eller flera av följande symtom

- Barnet kräks.
- Barnet har diarréer.
- Barnet mår illa.
- Barnet har ont i magen.
- Barnet har feber
- Barnet blir trött och orkeslös
- Barnet vill inte äta

Symtomen kommer ofta snabbt ett par dagar efter att barnet har smittats. Kräkningarna upphör ofta inom ett eller ett par dygn. Diarréerna kan pågå längre. Ibland upp till en vecka. Magsjuka är vanligast under vinterhalvåret, när vi lever tätare tillsammans inomhus. Man kan också bli magsjuk av kranvatten som innehåller bakterier, parasiter eller virus, och av dåligt tillagad mat, ofta efter att varit utomlands.

Diarré

Diarré hos barn kan bero på olika saker. Vanligast är att barnet har fått en virusinfektion i form av magsjuka

Vistelse i förskolan

Barn ska vara hemma när de kräks eller har diarré. De kan gå tillbaka till förskolan när de äter som vanligt och inte har kräcks eller haft vattentunn diarré under minst två dygn.

Hur smittas magsjuka?

Magsjuka kan spridas på olika sätt, beroende på om magsjukan orsakats av virus eller bakterier.

Magsjuka till följd av virus är en kontaktsmitta. Det innebär att den smittar mellan människor, via smittade ytor men kan även smitta via droppar i luften (Vinterkräksjukan, Calicivirus).